

SOSYAL PEDIATRİ DERNEĞİ'NİN SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA RUTİN DIŞI AŞILARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖNERİLERİ- 19 MAYIS 2025

(Bu tablo Derneğimizin BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMA GRUBU üyeleri tarafından Delphi Çalışması verilerine dayanılarak hazırlanmıştır.)

Emel GÜR, Sevtap VELİPAŞAOĞLU, Gonca KESKİNDİRİ, Meltem DİNLEYİCİ, Filiz ORHON, Feyza KOÇ, Meda KONDOLOT, Ahmet ERGİN

Sosyal Pediatri Derneği üyelerinin şema konusundaki ağırlıklı tercihleri aşağıdaki tablolarda koyu renkli harflerle ve koyu renkli arka planla belirtilmiştir. Diğer öneriler her bir aşı için açık renkle belirtilmiştir ve tablonun açıklama kısmına da eklenmiştir.
Bu tablolar sağlıklı çocuklar için rutin dışı aşılamaya takvimlerini içermektedir, kronik hastalık ya da diğer özel durumlardaki aşılamaya takvimlerini içermemektedir.

Aşılar	Aşılamaya başlama yaşı	2. ayın sonu	3. ayın sonu	4. ayın sonu	5. ayın sonu	6. ayın sonu	7. ayın sonu	9. ayın sonu	12. ayın sonu	14. ayın sonu	15. ayın sonu	24. ayın sonu	2-18 yaş	Açıklamalar
Nimenrix	2-6 ay arası	I. ve II. dozlar							III					İlk 2 doz 2 ay ara ile ve 3. doz en erken bebek 12. ayını tamamladığında uygulanır.
	7-11 ay arası						I		II					7-11 ay arası başladığında en az 2 ay ara ile 2 doz olarak ve 2. doz en erken bebek 12. ayını tamamladığında uygulanır.
	≥12 ay											I		12. ayını tamamlamış olanlarda tek doz uygulanır.
Menveo	2-6 ay arası	I ve II. dozlar							III					İlk 2 doz 2 ay ara ile ve 3. doz en erken bebek 12. ayını tamamladığında uygulanır.
	7-11 ay arası						I		II					7-11 ay arası başladığında en az 2 ay ara ile 2 doz olarak ve 2. doz en erken bebek 12. ayını tamamladığında uygulanır.
	12-23 ay arası								I	II				12-23 ay arasında başladığında en az 2 ay ara ile 2 doz uygulanır.
	≥24 ay											I		24. ayını tamamlamış olanlarda tek doz uygulanır.
Menactra	9-11 ay arası							I	II					En erken 9. ayda başlanır, 3 ay ara ile 2 doz uygulanır.
	12-23 ay arası								I	II				12-23 ay arası başladığında en az 3 ay ara ile 2 doz uygulanır.
	≥24 ay											I		24. ayını tamamlamış olanlarda tek doz olarak uygulanır.
MenQuadfi	≥12 ay											I		12. ayını tamamlamış olanlarda tek doz olarak uygulanır.

Bu tabloda bulunan meningokok aşılardan herhangi birinin kullanılması yeterlidir. Bu aşılardan her biri meningokokların ACWY serogruplarına karşı koruma sağlama amacıyla farklı firmalar tarafından farklı protein konjugatlar [Nimenrix (MenACWY-TT), Menactra (MenACWY-D), Menveo (MenACWY-CRM), MenQuadfi (MenACWY-TT)] kullanılarak üretilmiştir.

Aşılar	Aşılamaya başlama yaşı	2. ayın sonu	3. ayın sonu	4. ayın sonu	5. ayın sonu	6. ayın sonu	8. ayın sonu	9. ayın sonu	12. ayın sonu	14. ayın sonu	15. ayın sonu	24. ayın sonu	26. ayın sonu	2-18 yaş	Açıklamalar
Bexsero	2-5 ay arası	I. ve II. dozlar							III						İlk 2 doz 2 ay ara ile, 3. doz en erken bebek 12. ayını tamamladığında ve 2. dozdan en az 6 ay sonra uygulanır.
	6-11 ay arası					I	II		III						6-11 ay arası başladığında en az 2 ay ara ile 3 doz olarak ve 3. doz en erken bebek 12. ayını tamamladığında uygulanır.
	12-23 ay arası								I	II		III			12-23 ay arasında başladığında ilk 2 doz arasında en az 2 ay bırakılır ve 3. doz ikincisinden en az 12 ay sonra uygulanır.
	≥24 ay													I. ve II. doz	24. ayını tamamlamış olanlarda 1 ay ara ile 2 doz uygulanır.

Bexsero aşısı (MenB-4C) meningokokların B serogrupuna karşı koruma sağlama amacıyla üretilmiş bir aşıdır. Üstteki tabloda bulunan meningokok aşıları ve diğer aşılarla aynı günde ya da bir zaman aralığı gözetilmesiz farklı günlerde uygulanabilir.

Aşılar	2. ayın sonu	3. ayın sonu	4. ayın sonu	5. ayın sonu	6. ayın sonu	7. ayın sonu	9. ayın sonu	12. ayın sonu	14. ayın sonu	15. ayın sonu	24. ayın sonu	26. ayın sonu	7 yaş	8 yaş	9 yaş	10 yaş	11 yaş	12 yaş	13 yaş	14 yaş	15-18 yaş	Açıklamalar
Rotarix¹	I		II																			• İkinci ayda rutin aşılarla birlikte başlanması önerilir. • Birinci doz 14 hafta 6 güne kadar herhangi bir zamanda uygulanabilir. • Dozlar arasında en az 4 hafta zaman bırakılmalıdır. • Son doz en geç bebek 8 aylık olduğunda uygulanabilir.
Rotateq¹	I		II		III																	• Hem kız hem erkek çocuklara 9-14 yaş arasında 6 ay ara ile 2 doz önerilir. İki doz şeması 15. doğum gününden önce başlanan aşılamalarda geçerlidir. • 15. doğum gününden sonra başlanan aşılamalarda 0, 2, 6 ay şeması ile 3 doz uygulanır.
Gardasil 9²																I. ve II. doz					I. II. ve III. doz	• Dokuz yaşına kadar ilk başlanan sene 2 doz, sonraki yıllarda tek doz uygulanır. • 13 yaş rutin Td yerine Tdap uygulanır. • 10 yılda bir yapılan Td pekiştirmelerinde Tdap uygulanır. • Daha önce Tdap ile aşılanmış olsalar bile gebelere her gebelikte 18-24. gestasyon haftaları arasında (32 haftanın sonuna kadar) bir doz Tdap önerilir.
İnfluenza³																Her yıl						
Adacel⁴																			I			
Boostrix⁴																						

1) Rotavirus aşıları

- Rotarix (RV1) 2 doz, Rotateq (RV5) ise 3 doz uygulanır. Bir marka ile başlanan aşılamanın aynı marka ile tamamlanması gerekir. Dozlar arasında marka değişimi olursa aşılamaya toplam 3 doz ile tamamlanır.
- İlk doz en erken bebek 6 haftalık iken başlanabilir
- İlk doz en geç bebek 14 hafta 6 günlük olduğunda uygulanabilir, daha sonra aşılamaya başlatılmaz
- Son doz 8 aylıktan büyük bebeklere uygulanamaz
- BCG ve OPA aşıları ile aynı gün ya da herhangi bir gün aralığı gözetilmesiz farklı günlerde uygulanabilir.

2) HPV aşısı

- Gardasil 9 (HPV9) aşısının ilk dozunun 14 yaştan önce uygulandığı sağlıklı çocuklarda ikinci doz zamanında çocuk 15 yaşına ulaşmış olsa bile aşılamaya toplam iki dozla tamamlanır.

3) Mevsimsel influenza aşıları

- Mevsimsel inaktif influenza aşısı (IIV4) uygulamasına en erken bebek 6 aylık olduğunda başlanabilir.
- İlk 8 yaşta ilk başladığı yıl 2 doz uygulanır
- İlk 8 yaşta ilk başladığı sene 2 doz uygulanmadı ise sonraki yıl 2 doz uygulanmalıdır
- Dokuz yaş ve üzerindeki tüm yaş gruplarında tek doz olarak uygulanır
- Tüm gebelere influenza sezonunda influenza aşısı uygulanmalıdır. Ayrıca 6 aylıktan küçük çocuklara yakın temasta olan bireylerin de koza stratejisi gereği influenza aşısı olmaları önerilir

4) Tdap aşıları

- İdeal olan erken süt çocukluğu döneminde bebekleri boğmacaya karşı korumak için Tdap aşısının gebelikte tüm gebelere uygulanmasıdır
- Gebelikte aşılanmamış annelere koza stratejisi çerçevesinde doğumdan sonra mümkün olduğunca erken dönemde başlayarak Tdap aşısı önerilir.
- Bebeğin 2, 4, 6. aydaki rutin primer boğmaca aşısı şeması tamamlandıktan sonra bebek korunmaya başlanacağı için koza stratejisini mümkün olduğunca erken dönemde, bebek altıncı aya ulaşmadan uygulamak gerekir