

## SOSYAL PEDIATRİ DERNEĞİ AŞISIZ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI TAKVİMİ ÖNERİSİ-22 OCAK 2026

(Bu tablo derneğimizin BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMA GRUBU üyeleri tarafından hazırlanmıştır.)

Emel GÜR, Filiz ORHON, Gonca KESKİNDEMİRCİ, Meltem DİNLEYİCİ, Sevtap VELİPAŞAOĞLU, Feyza KOÇ, Meda KONDOLOT, Ahmet ERGİN

İlk Başvuru Yaşı	4-11 ay*	12-47 ay**	48-71 ay***	6-12 yaş****	≥13 yaş*****
<b>İlk karşılaşma</b>	DaBT-İPA-Hib-HepB KPA PPD ile TCT	DaBT-İPA-Hib-HepB KPA <sup>e</sup> Hep-A <sup>d</sup> PPD ile TCT	DaBT-İPA-Hib-HepB <sup>h</sup> ya da DaBT-İPA ve Hep-B KPA <sup>e</sup> Hep-A PPD ile TCT	DaBT-İPA Hep-B Hep-A KKK Suçiçeği	Tdab ya da Td <sup>i</sup> İPA ya da OPA <sup>j</sup> Hep-B Hep-A KKK Suçiçeği
<b>2 gün sonra</b>	TCT sonucuna göre BCG  <i>Ek doz KKK aşısı 9 aylıktan itibaren 1 yaş öncesi tek doz uygulanır.<sup>a</sup></i>	TCT sonucuna göre BCG KKK <sup>b</sup> Suçiçeği	TCT sonucuna göre BCG KKK <sup>c</sup> Suçiçeği		
<b>İlk karşılaşmadan 1 ay sonra</b>	DaBT-İPA-Hib-HepB  <i>Ek doz KKK aşısı 9 aylıktan itibaren 1 yaş öncesi tek doz uygulanır.<sup>a</sup></i>  <i>KKK (1. doz) ve suçiçeği aşısı 12 aylıktan itibaren uygulanır.<sup>b</sup></i>		DaBT-İPA OPA Hep-B KKK <sup>c</sup>	DaBT-İPA OPA Hep-B KKK	Tdab ya da Td <sup>i</sup> OPA ve İPA <sup>k</sup> Hep-B KKK Suçiçeği
<b>İlk karşılaşmadan 2 ay sonra</b>	DaBT-İPA-Hib-HepB OPA KPA  <i>Ek doz KKK aşısı 9 aylıktan itibaren 1 yaş öncesi tek doz uygulanır.<sup>a</sup></i>  <i>KKK (1. doz) ve suçiçeği aşısı 12 aylıktan itibaren uygulanır.<sup>b</sup></i>	DaBT-İPA-Hib-HepB <sup>f</sup> ya da DaBT-İPA <sup>g</sup> ve Hep-B OPA KPA <sup>e</sup> KKK <sup>b</sup>			
<b>Son karşılaşmadan 6 ay sonra</b>	DaBT-İPA-Hib-HepB <sup>c</sup> OPA <sup>c</sup> KPA  <i>KKK (1. doz) ve suçiçeği aşısı 12 aylıktan itibaren uygulanır.<sup>b</sup></i>  <i>Hep-A aşısı 18 aylıktan itibaren uygulanır.<sup>d</sup></i>	DaBT-İPA OPA Hep-B Hep-A	DaBT-İPA OPA Hep-B Hep-A	DaBT-İPA OPA Hep-B Hep-A	Tdab ya da Td <sup>i</sup> OPA ve İPA <sup>k</sup> Hep-B Hep-A

<sup>a</sup>Ek doz KKK aşısı ile KKK (1. doz) ve suçiçeği aşısı arasında en az 1 ay olmalıdır.

<sup>b</sup>KKK aşısı 2. dozu (1. dozdan en az 1 ay sonra olmak şartıyla) çocuk 48 aylık iken "Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi" ne göre uygulanır.

<sup>c</sup>DaBT-İPA-Hib-Hep B aşısının 4. dozu (3. dozdan 6 ay sonra olmak şartıyla) ve OPA'nın 2. dozu 18 aylıktan itibaren "Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi" ne göre uygulanır.

<sup>d</sup>Hep-A aşısının ilk dozu 18 aylıktan itibaren uygulanmalı, ikinci ve son dozu ise en erken ilk dozdan 6 ay sonra yapılmalıdır.

<sup>e</sup>KPA ilk dozunu 12-23 ay arası alan çocuğa en az 2 ay sonra ikinci ve son doz uygulanır. Çocuğun yaşı 24-59 aylar arasında ise tek doz yeterli olup; 59 aylıktan büyükse KPA aşısı gereksizdir.

<sup>f</sup>DaBT-İPA-Hib-HepB aşısının ilk dozu 12-14 aylar arasında ise 2. dozu da DaBT-İPA-Hib-HepB şeklinde olmalıdır.

<sup>g</sup>DaBT-İPA-Hib-HepB aşısının ilk dozu 15-59 ay arasında ise 2. dozu DaBT-İPA (Hib aşısı içermeyen formu) şeklinde olmalıdır.

<sup>h</sup>İlk başvuru yaşı 60 ay ve üzerinde olan çocuklara DaBT-İPA (Hib aşısı içermeyen formu) aşısı uygulanmalıdır.

<sup>i</sup>KKK 1. doz ve 2. doz arasında en az 1 ay olmalıdır.

<sup>j</sup>Tdab tercih edilmeli mümkün değil ise Td uygulanmalıdır.

<sup>k</sup>İlk doz uygulaması için öncelikli olarak İPA tercih edilmeli, mümkün değilse OPA uygulanmalıdır.

<sup>l</sup>OPA ve İPA eş zamanlı önerilir, mümkün değilse OPA uygulanmalıdır.

Önemli Not: Bu şema yalnızca "Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi" içeriğinde yer alan aşıları içermektedir <https://asi.saglik.gov.tr/bagisiklama-programi-ve-asi-takvimi/asi-takvimi.html>. Rutin dışı aşılar uygun yaş, doz sayısı ve doz aralıkları dikkate alınarak mutlaka önerilmelidir <https://www.sosyalpediatri.org.tr/assets/files/asi-uygulamalari/au1.pdf>.

\*Çocukluk çağı aşılamalarına; 24. ay Hep-A aşısı 2. doz (İlk dozdan en az 6 ay sonra); 48. ay DaBT-İPA aşısı (önceki dozdan en az 6 ay sonra), KKK aşısı 2. doz ve 13 yaş Td aşılamaları ile devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

\*\*Çocukluk çağı aşılamalarına; 48. ay DaBT-İPA aşısı (bir önceki doz DaBT-İPA aşısından en az 6 ay sonra), KKK aşısı 2. doz ve 13 yaş Td aşılamaları ile devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

\*\*\*Çocukluk çağı aşılarına DaBT-İPA aşısı (bir önceki doz DaBT-İPA aşısından en az 12 ay sonra) ve 13 yaş Td aşılamaları ile devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

\*\*\*\*Çocukluk çağı aşılarına 13 yaş Td aşılaması ile (bir önceki doz DaBT-İPA aşısından en az 12 ay sonra) devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

\*\*\*\*\*Td ya da Tdab son dozundan sonra 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.