


GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI



2018	DOĞUM	1.AY	2.AY	3.AY	4.AY	6.AY	9.AY	12.AY	18.AY	24.AY	1.SNF	5.SNF	6.SNF	8.SNF
Hepatit B	I	II				III								
BCG			I											
KKK								I			R			
DaBT-IPA-Hib			I		II	III			R					
DaBT-IPA											R			
OPA						I			II					
Td														R
Pnömonokok			I		II	III		R						
Hepatit A									I	II				
Suçiçeği								I						
Grip****														
Rotavirus			I	II	III*									
HPV**												I	II	
Meningokok***							I	II						



* RV5 aşısı 3 doz, RV1 aşısı 2 doz uygulanır.

**HPV aşısı 9-14 yaşları arasında 6-12 ay arayla 2 doz uygulanır; 15. yaş gününden sonra başlandıysa 3 doz (0, 1-2, 6. aylarda) uygulanır.

***Men ACWY-D ve Men ACWY-CRM 197 aşıları 9. ve 12. aylarda 2 doz, Men ACWY-TT aşısı 12. ayda tek doz uygulanır. Men ACWY-D ve Men ACWY-CRM 197 aşıları 2 yaşından sonra tek doz uygulanır.

****6 aylıktan büyük çocuklara (özellikle 6 ay-5 yaş arası) kontrendikasyon yoksa her yıl (tercihen Ekim-Kasım ayları içinde) inaktif grip aşısı önerilir. Daha önce aşılanmamış 9 yaşından küçük çocuklara bir ay arayla 2 doz uygulanır. Üç yaşından küçük çocuklara 0.25 ml İM uygulanır.