



SOSYAL PEDIATRİ DERNEĞİ AŞISIZ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI TAKVİMİ ÖNERİSİ-30 AĞUSTOS 2026

(Bu tablo derneğimizin BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMA GRUBU üyeleri tarafından hazırlanmıştır.)

Emel GÜR, Filiz ORHON, Gonca KESKİNDEMİRCİ, Meltem DİNLEYİCİ, Feyza KOÇ, Meda KONDOLOT, Ahmet ERGİN

İlk Başvuru Yaşı	4-11 ay*	12-47 ay**	48-71 ay***	6-12 yaş****	≥13 yaş*****
İlk karşılaşma	DaBT-İPA-Hib-HepB KPA PPD ile TCT	DaBT-İPA-Hib-HepB KPA ^e Hep-A ^d PPD ile TCT	DaBT-İPA-Hib-HepB ^h ya da DaBT-İPA ve Hep-B KPA ^e Hep-A PPD ile TCT	DaBT-İPA Hep-B Hep-A KKK Suçiçeği	Tdab ya da Td ^j İPA ya da OPA ^k Hep-B Hep-A KKK Suçiçeği
2 gün sonra	TCT sonucuna göre BCG <i>Ek doz KKK aşısı 9 aylıktan itibaren 1 yaş öncesi tek doz uygulanır.^a</i>	TCT sonucuna göre BCG KKK Suçiçeği	TCT sonucuna göre BCG KKK Suçiçeği		
İlk karşılaşmadan 1 ay sonra	DaBT-İPA-Hib-HepB <i>Ek doz KKK aşısı 9 aylıktan itibaren 1 yaş öncesi tek doz uygulanır.^a</i> <i>KKK (1. doz) ve suçiçeği (1.doz) aşısı 12 aylıktan itibaren uygulanır.^b</i>		DaBT-İPA OPA Hep-B KKK ⁱ	DaBT-İPA OPA Hep-B KKK ⁱ	Tdab ya da Td ^j OPA ve İPA ^l Hep-B KKK ^m Suçiçeği ^m
İlk karşılaşmadan 2 ay sonra	DaBT-İPA-Hib-HepB OPA KPA <i>Ek doz KKK aşısı 9 aylıktan itibaren 1 yaş öncesi tek doz uygulanır.^a</i> <i>KKK (1. doz) ve suçiçeği (1.doz) aşısı 12 aylıktan itibaren uygulanır.^b</i>	DaBT-İPA-Hib-HepB ^f ya da DaBT-İPA ^g ve Hep-B OPA KPA ^e KKK ^b			
İlk karşılaşmadan 3 ay sonra	<i>Ek doz KKK aşısı 9 aylıktan itibaren 1 yaş öncesi tek doz uygulanır.^a</i> <i>KKK (1. doz) ve suçiçeği (1.doz) aşısı 12 aylıktan itibaren uygulanır.^b</i>	Suçiçeği ^b	Suçiçeği ⁱ	Suçiçeği ⁱ	
İlk karşılaşmadan 8 ay sonra	DaBT-İPA-Hib-HepB ^c OPA ^c KPA <i>KKK (1. doz) ve suçiçeği (1.doz) aşısı 12 aylıktan itibaren uygulanır.^b</i> <i>Hep-A aşısı 18 aylıktan itibaren uygulanır.^d</i>	DaBT-İPA OPA Hep-B Hep-A	DaBT-İPA OPA Hep-B Hep-A	DaBT-İPA OPA Hep-B Hep-A	Tdab ya da Td ^j OPA ve İPA ^l Hep-B Hep-A

^aEk doz KKK aşısı ile KKK (1. doz) ve suçiçeği (1.doz) aşısı arasında en az 1 ay olmalıdır.

^bÇocuk 48 aylık olduğunda KKK aşısı 2. dozu (1. dozdan en az bir ay sonra) ve suçiçeği aşısı 2. dozu (1. dozdan en az 3 ay sonra) “Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi”ne göre uygulanır.

^cDaBT-İPA-Hib-Hep B aşısının 4. dozu (3. dozdan 6 ay sonra olmak şartıyla) ve OPA’nın 2. dozu 18 aylıktan itibaren “Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi” ne göre uygulanır.

^dHep-A aşısının ilk dozu 18 aylıktan itibaren uygulanmalı, ikinci ve son dozu ise en erken ilk dozdan 6 ay sonra yapılmalıdır.

^eKPA ilk dozunu 12-23 ay arası alan çocuğa en az 2 ay sonra ikinci ve son doz uygulanır. Çocuğun yaşı 24-59 aylar arasında ise tek doz yeterli olup; 59 aylıktan büyükse KPA aşısı gereksizdir.

^fDaBT-İPA-Hib-HepB aşısının ilk dozu 12-14 aylar arasında ise 2. dozu da DaBT-İPA-Hib-HepB şeklinde olmalıdır.

^gDaBT-İPA-Hib-HepB aşısının ilk dozu 15-59 ay arasında ise 2. dozu DaBT-İPA (Hib aşısı içermeyen formu) şeklinde olmalıdır.

^hİlk başvuru yaşı 60 ay ve üzerinde olan çocuklara DaBT-İPA (Hib aşısı içermeyen formu) aşısı uygulanmalıdır.

ⁱKKK aşısının 1. ve 2. dozu arasında en az bir ay; suçiçeği aşısının 1. ve 2. dozu arasında en az 3 ay olmalıdır.

^jTdab tercih edilmeli, mümkün değil ise Td uygulanmalıdır.

^kİlk doz uygulaması için öncelikli olarak İPA tercih edilmeli, mümkün değilse OPA uygulanmalıdır.

^lOPA ve İPA eş zamanlı önerilir, mümkün değilse OPA uygulanmalıdır.

^mKKK ve suçiçeği aşısı 1. ve 2. dozları arasında en az bir ay olmalıdır (13 yaş ve üstü çocuklar için).

Önemli Not: Bu şema yalnızca “Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi” içeriğinde yer alan aşıları içermektedir <https://asi.saglik.gov.tr/bagisiklama-programi-ve-asi-takvimi/asi-takvimi.html>. Rutin dışı aşılar uygun yaş, doz sayısı ve doz aralıkları dikkate alınarak mutlaka önerilmelidir <https://www.sosyalpediatri.org.tr/assets/files/asi-uygulamalari/au1.pdf>.

*Çocukluk çağı aşılamalarına; 24. ay Hep-A aşısı 2. doz (ilk dozdan en az 6 ay sonra); 48. ay DaBT-İPA aşısı (önceki dozdan en az 6 ay sonra), KKK aşısı 2. doz, suçiçeği aşısı 2. doz ve 13 yaş Td aşılamaları ile devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

**Çocukluk çağı aşılamalarına; 48. ay DaBT-İPA aşısı (bir önceki doz DaBT-İPA aşısından en az 6 ay sonra), KKK aşısı 2. doz, suçiçeği aşısı 2. doz ve 13 yaş Td aşılamaları ile devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

***Çocukluk çağı aşılarına DaBT-İPA aşısı (bir önceki doz DaBT-İPA aşısından en az 12 ay sonra) ve 13 yaş Td aşılamaları ile devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

****Çocukluk çağı aşılarına 13 yaş Td aşılması ile (bir önceki doz DaBT-İPA aşısından en az 12 ay sonra) devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

*****Td ya da Tdab son dozundan sonra 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

Tüm hakları Sosyal Pediatri Derneği’ne aittir.