



SOSYAL PEDIATRİ DERNEĞİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI UYGULAMALARINDA EN ERKEN YAŞ VE EN KISA DOZ ARALIKLARI ÖNERİLERİ-9 EYLÜL 2026

(Bu tablo Derneğimizin BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMA GRUBU üyeleri tarafından hazırlanmıştır)

Emel GÜR, Feyza KOÇ, Meltem DİNLEYİCİ, Meda KONDOLOT, Filiz ORHON, Gonca KESKİNDEMİRCİ, Ahmet ERGİN

Aşılar	İlk doz için önerilen yaş	İlk doz için en erken yaş ^a	Dozlar arasında en kısa aralık ^a		
			Doz 1-2	Doz 2-3	Doz 3-4
Hepatit B ^b	Doğum	Doğum	4 hft	8 hft	
DaBT-İPA-Hib-Hep B	8 hft	6 hft	4 hft	4 hft	6 ay
KPA 13 ^c	8 hft	6 hft	4-8 hft	4-8 hft (9-18. ayda uygulanmalı)	
KPA 20	8 hft	6 hft	4 hft	4 hft	8 hft (11-15.ayda uygulanmalı)
BCG	8 hft	Doğum			
İPA/OPA ^d	8 hft (İPA)	6 hft (İPA)	8 hft (İPA)	4-8 hft (İPA+OPA)	4-8 hft (İPA+OPA)
KKK ^e	9-12 ay	12 ay	4 hft		
Su çiçeği ^f	12 ay	12 ay	3 ay (≥13 yaş için 1 ay)		
Hepatit A ^g	12-18 ay	12 ay	6 ay		
DaBT-İPA	4 yaş	6 hft	4 hft	4 hft	6 ay
Td ^h	13 yaş	7 yaş	5 yıl		
Tdab ^h	≥11 yaş	4 yaş	5 yıl		
İnfluenza ⁱ	6 ay	6 ay	4 hft		
Hib	8 hft	6 hft	4 hft	4 hft	8 hft (12-15. ayda uygulanmalı)
Polisakkarit pnömokok ^j	2 yaş	2 yaş	5 yıl		
Rotavirüs					
Rotarix	8 hft	6 hft	4 hft		
Rotateq	8 hft	6 hft	4 hft	4 hft	
Meningokok ACWY ^k					
Nimenrix	8 hft	6 hft	8 hft	8 hft (12. ayda uygulanmalı)	
Menveo (4 dozluk seri)	8 hft	8 hft	8 hft	8 hft	12 hft (12-16. ayda uygulanmalı)
Menveo (3 dozluk seri)	8 hft	8 hft	8 hft	8 hft (12. ayda uygulanmalı)	
Menactra	9 ay	9 ay	3 ay		
MenQuadfi	8 hft	6 hft	8 hft	8 hft	8 hft (12.aydan sonra uygulanmalı)
Meningokok B ^k					
Bexsero	8 hft	8 hft	8 hft	6 ay (12.-15. ayda uygulanmalı)	
HPV ^l (2 dozluk seri)	11-12 yaş	9 yaş	5 ay		
HPV ^l (3 dozluk seri)	11-12 yaş	9 yaş	4 hft	12 hft	

Kısaltmalar: DaBT-İPA-Hib-Hep B: Difteri- aselüler boğmaca -tetanoz-İnaktive polio - Haemophilus influenzae tip b-Hepatit B kombine aşısı, KPA13: 13 bileşenli konjuge pnömokok aşısı, KPA 20: 20 bileşenli konjuge pnömokok aşısı, BCG: Bacillus Calmette-Guérin aşısı, İPA: İnaktive polio aşısı, OPA: Oral polio aşısı, KKK: Kızamık-kızamıkçık-kabakulak, DaBT-İPA: Difteri- aselüler boğmaca -tetanoz-İnaktive polio aşısı, Td: Erişkin tetanoz-difteri aşısı, Tdab: Tetanoz-difteri-aselüler boğmaca, HPV: Human papilloma virüs

- Bu tabloda belirtilen ‘en erken yaş’ ve ‘en kısa aralıklar’, rutin aşılama takviminden farklı kavramlardır ve özel durumlarda (örn: gecikmiş/eksik aşılanmanın tamamlanmasında) kullanılır. Rutin uygulamalarda T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi esas alınmalıdır.
- Hep B aşısının 3. dozu, Hep B 2. dozundan en az 8 hafta sonra ve Hep B 1. Dozundan en az 16 hafta sonra uygulanmalı ve 3. doz için en erken yaş 24 hafta olmalıdır.
- Ülkemizde aşı takviminde KPA 13 2+1 doz şeması ile uygulanmaktadır. Ancak 3+1 doz uygulaması gerektiğinde doz aralıkları KPA 20’de belirtildiği şekilde olmalıdır.
- Dünya Sağlık Örgütü’nün polio aşılması önerileri (İPA ve OPA ardışık şeması) esas alınarak hazırlanmıştır. Ülkemizde İPA karma aşılar içinde yer almakta olup ilk iki doz İPA, ardından iki doz OPA ve İPA birlikte uygulanmaktadır. Sonrasında bir doz daha İPA ulusal aşı takvimine göre yapılmaktadır. OPA yüksek riskli bölgelerde doğumdan itibaren uygulanabilir.
- Ülkemizde rutin aşı şemasında 9. ayda ek bir doz KKK aşısı uygulanmaktadır. Salgın, endemik bölgeye seyahat vb olağanüstü durumlarında KKK en erken 6. ayda uygulanabilir. Bir yaş öncesi uygulandığında önceki dozla arada en az 4 hafta süre bırakılarak en erken 12. aydan itibaren rutin aşı takvimine göre aşılama sürdürülmelidir.
- Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin kapsama hedeflerine göre suçiçeği aşısını en erken 9. ayda uygulayabileceklerini bildirmektedir. Ancak bir yaş altında uygulandığında ulusal aşı takvimine göre aşılamaya devam edilmelidir. Bkz: <https://www.who.int/publications/m/item/table-2-summary-of-who-position-papers-recommended-routine-immunizations-for-children>.
- Salgın, endemik bölgeye seyahat vb olağanüstü durumlarında Hepatit A aşıları en erken 6. ayda uygulanabilir. Ancak bir yaş altında uygulandığında ulusal aşı takvimine göre aşılama sürdürülmelidir.
- Td ve Tdab aşıları için belirtilen aralıklar; çocukluk çağı rutin aşı şemasında DaBT içeren aşılar ile aşılanmanın tamamlanmasını takip eden dozlar için geçerlidir. Td ve Tdab aşılarının çocuklarda primer aşılama olarak uygulanması durumunda doz sayısı ve aralıkları farklıdır. Bkz: <https://www.sosyalpediatri.org.tr/assets/files/asi-uygulamalari/au5.pdf>
- 6 ay-8 yaş arasındaki çocuklarda ilk kez influenza aşısı uygulanıyorsa en az 4 hafta ara ile 2 doz uygulanır. Daha önce uygun şekilde ≥2 doz influenza aşısı uygulanmış çocuklarda tek doz yeterlidir. Dokuz yaş ve üzeri çocuklara tek doz uygulanır.
- Özel durumlarda son KPA dozundan 8 hft sonra önerilen bir aşıdır. İkinci PPA23 dozu; ilk dozdan 5 yıl sonra ciddi pnömokok enfeksiyonu için en yüksek riske sahip kişilere önerilmektedir.
- Rutin dışı aşıların uygulanmaya başlandığı yaşa göre doz sayısı ve doz aralık önerileri için bkz <https://www.sosyalpediatri.org.tr/assets/files/asi-uygulamalari/au1.pdf>
- HPV aşısı 9-14 yaş arasında iki doz, ≥15 yaş ise 3 doz olarak uygulanır. Üç dozluk seride 1. ve 3. doz arasında en az 5 ay süre olması gerekir.

Ticari isimler sadece tanımlama amacı ile kullanılmıştır.

Tüm hakları Sosyal Pediatri Derneği’ne aittir.