



SOSYAL PEDIATRİ DERNEĞİ AŞISIZ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI TAKVİMİ ÖNERİSİ-19 MAYIS 2025

(Bu tablo derneğimizin BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMA GRUBU üyeleri tarafından hazırlanmıştır.)

Emel GÜR, Filiz ORHON, Gonca KESKİNDEMİRCİ, Meltem DİNLEYİCİ, Sevtap VELİPAŞAOĞLU, Feyza KOÇ, Meda KONDOLOT, Ahmet ERGİN

İlk Başvuru Yaşı	4-11 ay*	12-47 ay**	48-71 ay***	6-12 yaş****	≥13 yaş*****
İlk karşılaşma	DaBT-İPA-Hib-HepB KPA PPD ile TCT	DaBT-İPA-Hib-HepB KPA ^e Hep-A ^d PPD ile TCT	DaBT-İPA-Hib-HepB ^h ya da DaBT-İPA ve Hep-B KPA ^e Hep-A PPD ile TCT	DaBT-İPA Hep-B Hep-A KKK Suçiçeği	Tdab ya da Td ⁱ İPA ya da OPA ^j Hep-B Hep-A KKK Suçiçeği
2 gün sonra	TCT sonucuna göre BCG <i>Ek doz KKK aşısı 9 aylıktan itibaren uygulanır.^a</i>	TCT sonucuna göre BCG KKK ^b Suçiçeği	TCT sonucuna göre BCG KKK ⁱ Suçiçeği		
İlk karşılaşmadan 1 ay sonra	DaBT-İPA-Hib-HepB <i>Ek doz KKK aşısı 9 aylıktan itibaren uygulanır.^a KKK (1. doz) ve suçiçeği aşısı 12 aylıktan itibaren uygulanır.^b</i>		DaBT-İPA OPA Hep-B KKK ⁱ	DaBT-İPA OPA Hep-B KKK	Tdab ya da Td ⁱ OPA ve İPA ^k Hep-B KKK Suçiçeği
İlk karşılaşmadan 2 ay sonra	DaBT-İPA-Hib-HepB OPA KPA <i>Ek doz KKK aşısı 9 aylıktan itibaren uygulanır.^a KKK (1. doz) ve suçiçeği aşısı 12 aylıktan itibaren uygulanır.^b</i>	DaBT-İPA-Hib-HepB ^f ya da DaBT-İPA ^g ve Hep-B OPA KPA ^e KKK ^b			
Son karşılaşmadan 6 ay sonra	DaBT-İPA-Hib-HepB ^c OPA ^c KPA <i>KKK (1. doz) ve suçiçeği aşısı 12 aylıktan itibaren uygulanır.^b Hep-A aşısı 18 aylıktan itibaren uygulanır.^d</i>	DaBT-İPA OPA Hep-B Hep-A	DaBT-İPA OPA Hep-B Hep-A	DaBT-İPA OPA Hep-B Hep-A	Tdab ya da Td ⁱ OPA ve İPA ^k Hep-B Hep-A

^aEk doz KKK aşısı ile KKK (1. doz) ve suçiçeği aşısı arasında en az 1 ay olmalıdır.

^bKKK aşısı 2. dozu (1. dozdan en az 1 ay sonra olmak şartıyla) çocuk 48 aylık iken "Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi" ne göre uygulanır.

^cDaBT-İPA-Hib-Hep B aşısının 4. dozu (3. dozdan 6 ay sonra olmak şartıyla) ve OPA'nın 2. dozu 18 aylıktan itibaren "Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi" ne göre uygulanır.

^dHep-A aşısının ilk dozu 18 aylıktan itibaren uygulanmalı, ikinci ve son dozu ise en erken ilk dozdan 6 ay sonra yapılmalıdır.

^eKPA ilk dozunu 12-23 ay arası alan çocuğa en az 2 ay sonra ikinci ve son doz uygulanır. Çocuğun yaşı 24-59 aylar arasında ise tek doz yeterli olup; 59 aylıktan büyükse KPA aşısı gereksizdir.

^fDaBT-İPA-Hib-HepB aşısının ilk dozu 12-14 aylar arasında ise 2. dozu da DaBT-İPA-Hib-HepB şeklinde olmalıdır.

^gDaBT-İPA-Hib-HepB aşısının ilk dozu 15-59 ay arasında ise 2. dozu DaBT-İPA (Hib aşısı içermeyen formu) şeklinde olmalıdır.

^hİlk başvuru yaşı 60 ay ve üzerinde olan çocuklara DaBT-İPA (Hib aşısı içermeyen formu) aşısı uygulanmalıdır.

ⁱKKK 1. doz ve 2. doz arasında en az 1 ay olmalıdır.

^jTdab tercih edilmeli mümkün değil ise Td uygulanmalıdır.

^kİlk doz uygulaması için öncelikli olarak İPA tercih edilmeli, mümkün değilse OPA uygulanmalıdır.

^kOPA ve İPA eş zamanlı önerilir, mümkün değilse OPA uygulanmalıdır.

Önemli Not: Bu şema yalnızca "Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi" içeriğinde yer alan aşıları içermektedir.(bk.: <https://asi.saglik.gov.tr/asi-takvimi2>). Rutin dışı aşılar uygun yaş, doz sayısı ve doz aralıkları dikkate alınarak mutlaka önerilmelidir (bk.: Sosyal Pediatri Derneği <https://www.sosyalpediatri.org.tr/uploads/sospedasi%202024%20%2822%29.pdf>).

*Çocukluk çağı aşılamlarına; 24. ay Hep-A aşısı 2. doz (İlk dozdan en az 6 ay sonra); 48. ay DaBT-İPA aşısı (önceki dozdan en az 6 ay sonra), KKK aşısı 2. doz ve 13 yaş Td aşılamları ile devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

**Çocukluk çağı aşılamlarına; 48. ay DaBT-İPA aşısı (bir önceki doz DaBT-İPA aşısından en az 6 ay sonra), KKK aşısı 2. doz ve 13 yaş Td aşılamları ile devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

***Çocukluk çağı aşılamlarına DaBT-İPA aşısı (bir önceki doz DaBT-İPA aşısından en az 12 ay sonra) ve 13 yaş Td aşılamları ile devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

****Çocukluk çağı aşılamlarına 13 yaş Td aşılaması ile (bir önceki doz DaBT-İPA aşısından en az 12 ay sonra) devam edilir. Sonrasında 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

*****Td ya da Tdab son dozundan sonra 10 yılda bir Td rapel doz tekrarlanmalıdır.

Tüm hakları Sosyal Pediatri Derneği'ne aittir.